NERVAL®

Antiépileptique barbiturique

Dans quel cas le médicament NERVAL® est-il prescrit ?

Ce médicament est un *anticonvulsivant* qui appartient à la famille des barbituriques.

Il est utilisé dans le traitement de certaines formes d'*épilepsie*.

Présentations du médicament NERVAL®

NERVAL® 100 mg : comprimé sécable; boîte de 20

Composition du médicament NERVAL®

	p cp
Phénobarbital	100 mg

Contre-indications du médicament NERVAL®

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

- *allergie* aux barbituriques,
- *porphyrie*,
- *insuffisance respiratoire* grave,
- en association avec les produits de *phytothérapie* contenant du millepertuis.
- Il faut se référer à la notice de l'emballage pour tout effet notoire d'un des excipients du médicament.

Attention

Ne modifiez, ni n'interrompez jamais votre traitement sans l'avis de votre médecin : risque de réapparition des *convulsions*, même si aucune crise n'est survenue depuis une longue période.

Des précautions sont nécessaires en cas d'insuffisance hépatique ou rénale.

Un traitement prolongé chez l'enfant peut nécessiter la prise conjointe de *vitamine D*.

Évitez les boissons alcoolisées : augmentation du risque de somnolence.

Ce médicament peut induire une somnolence, parfois intense chez certaines personnes. Cette somnolence peut être augmentée par la prise d'*alcool* ou d'autres médicaments sédatifs. La conduite et l'utilisation de machines dangereuses sont déconseillées, surtout dans les heures qui suivent la prise du médicament.

Interactions du médicament NERVAL® avec d'autres substances

Ce médicament ne doit associé aux produits de *phytothérapie* contenant du millepertuis : risque de diminution de l'efficacité de l'antiépileptique.

Il peut interagir avec les contraceptifs oraux (pilule) : risque d'inefficacité de la contraception.

Informez par ailleurs votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez un *anticoagulant* oral, un *antidépresseur* imipraminique, un *corticoïde*, un *digitalique*, un *antiarythmique*, un *bêtabloquant*, un *sédatif*, un médicament contenant de la doxycycline, de la carbamazépine ou de la théophylline.

Fertilité, grossesse et allaitement

Grossesse :

Si une grossesse survient sous traitement, consultez votre médecin. L'arrêt brutal de ce médicament expose à la réapparition de crises préjudiciables à la mère et à l'enfant à naître. Le médecin appréciera le risque éventuel lié à l'utilisation de ce

médicament dans votre cas. Des examens particuliers permettent de vérifier l'absence d'anomalie chez l'enfant à naître.

Si le traitement est poursuivi jusqu'à l'accouchement, une supplémentation en *vitamine* K1 en fin de grossesse peut être nécessaire pour éviter un déficit en cette *vitamine* chez le *nouveau-né*.

Allaitement :

Ce médicament passe dans le lait maternel : l'allaitement est déconseillé.

Mode d'emploi et posologie du médicament NERVAL®

Posologie usuelle :

La posologie est variable d'un sujet à l'autre. Elle ne dépend pas de la gravité des troubles mais de la réaction de chacun.

Seul le médecin peut la définir.

Mode d'administration : voie orale.

Conseils

Veillez à ne jamais manquer de ce médicament ; lors de vos déplacements, munissez-vous d'une réserve ou de votre ordonnance en cours de validité.

Effets indésirables possibles du médicament NERVAL®

Somnolence, réveil difficile.

Troubles de la coordination, vertiges.

Éruption cutanée.

Réaction allergique.

Douleurs articulaires, notamment à l'épaule.

Troubles de l'humeur, *carence* en acide folique pouvant être responsable d'une *anémie.*

Très rarement : augmentation des *transaminases*, *hépatite*.

Rarement, en début de traitement : augmentation paradoxale de la fréquence des crises d'*épilepsie* ou modification de leurs caractéristiques.